

Устранение факторов уязвимости людей, проходящих лечение ТБ


Beatrice Blythe, Beverley Stringer, Vanja Kovačič
MSF

Справочная информация



- Хорошо известно, что **социальные аспекты** влияют на **возможности диагностики и лечения ТБ** (Kurbatova et al., 2012; Horter et al., 2016; Stringer et al., 2016, 2021).
- Глобальные усилия по борьбе с ТБ все чаще требуют принятия мер по **более эффективному устранению этих факторов** (ВОЗ; Wingfield, 2016).
- Цель программы Министерства здравоохранения/MSF «Zero TB» в Кулябе заключалась в **значительном снижении заболеваемости ТБ**.
- Для достижения этой цели необходимо было **понять и устранить факторы уязвимости людей, больных ТБ**.

Guidance on social protection for people affected by tuberculosis



«Что влияет на способность людей получать доступ к медицинской помощи и/или соблюдать режим лечения ТБ в Кулябе?»

Цель:

- i) Изучить факторы уязвимости людей, больных туберкулезом (ТБ) в Кулябе
- ii) Разработать программу «Zero TB» для устранения этих факторов уязвимости

Методы:

- Рамочная программа MSF по устранению уязвимостей
- Более 70 интервью (ключевые информаторы, бывшие больные ТБ, члены семей, медицинские работники)
- Неформальные беседы, наблюдения в домах больных, полевые заметки с собраний жителей общин



Результаты оценки 1: социальные факторы уязвимости

- **бедность:** внимание больных было сосредоточено не на медицинских проблемах лечения ТБ, а на выживании и удовлетворении основных потребностей (еда, одежда, ресурсы для отопления домов)
- **отсутствие поддержки со стороны семьи/общины:** нехватка финансовых средств, сложные условия жизни, отсутствие социальной защиты (ощущение, что о тебе не заботятся), психическое заболевание
- **маргинализация:** злоупотребление психоактивными веществами и наркотическая зависимость; работа в сфере секс-услуг; бездомность; попрошайничество, прошлая судимость с отбыванием тюремного заключения; ВИЧ
- **трудовая миграция**
- **женский пол**



Результаты оценки 2: домашнее насилие

- зафиксировано у **двух третей** опрошенных женщин, больных ТБ
- **физическое, психологическое, сексуальное и экономическое насилие**
- **насилие, связанное с ТБ:** мужья и родственники мужа отказывали женщинам в медицинской помощи, прерывали лечение, ограничивали прием пищи, подвергали дополнительному насилию, если женщины были слишком слабы, чтобы выполнять домашние дела, риск развода и отречения
- подверженность домашнему насилию оказала значительное негативное **воздействие на физическое и психическое здоровье**



Ответные меры 1, принятые в рамках программы: социальные факторы уязвимости

- **Социально-экономический скрининг** социальным работником и оказание социальной поддержки
- **Визиты многопрофильных групп на дом** к пациентам с ограниченной подвижностью
- **Индивидуальная психосоциальная поддержка**, помимо консультирования по вопросам соблюдения режима лечения, консультантами и психологами
- **Пропаганда здорового образа жизни** для борьбы со стигмой
- **Целевой активный скрининг** маргинализированных групп в тесном сотрудничестве с партнерскими организациями
- Распространение в **аэропорту** информационно-просветительских материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, среди трудовых мигрантов



Ответные меры 2, принятые в рамках программы: домашнее насилие

- Составление карты с **маршрутом направления пациентов**
- **Обучение** персонала медицинских и психиатрических учреждений оказанию **оперативной поддержки**, включая составление плана **обеспечения безопасности** и направление к специалистам
- Установление связи с **местными организациями**, предоставляющими услуги по обучению и поддержке
- Формирование **женских групп** в больнице для обсуждения вопросов, связанных со здоровьем
- **Специализированная психосоциальная поддержка** женщин и детей
- **Госпитализация по социальным причинам**
- **Кампания** по повышению осведомленности о домашнем насилии как о препятствии к оказанию противотуберкулезной помощи



Заключение

- Представляется целесообразным оценивать социальные факторы уязвимости и интегрировать ответные меры по их устранению в программы борьбы с ТБ
- Это пример того, как можно интегрировать экономическую, социальную, психологическую и физическую поддержку
- Необходимо оказывать индивидуальную поддержку пациентам учетом их собственных факторов уязвимости
- Новые медицинские средства борьбы с ТБ предоставляют возможность рассмотреть и интегрировать поддержку, особенно наиболее уязвимым слоям населения



Спасибо за внимание

